牛 β 乳球蛋白基因5'调控成分的分离、克隆及序列分析*

石玉强, 张涌, 郑月茂, 刘建忠, 张志平

(西北农林科技大学 生物工程研究所, 陕西 杨陵 712100)

[摘要] 利用PCR方法克隆了牛 β 乳球蛋白基因5'调控成分(1 449 bp), 其中包括5'侧翼序列(645 bp), 第一外显子及第一内含子(804 bp)。PCR产物回收纯化后, 克隆在pMD 18-T Vector的T位点。序列分析表明, 该序列与牛 β 乳球蛋白A型基因、牛 β 乳球蛋白B型基因、山羊和绵羊 β 乳球蛋白基因的同源性分别为98.55%, 99.79%, 90.70%和90.09%。计算机分析表明, 此调控成分含有诸多调节因子结合位点或反应元件, 其中包括视黄酸反应元件(RARE)、佛波酯反应元件(TRE)、乳腺特异性因子(MSBF)和核因子1(NF1)结合位点等, 提示此调控成分可调控外源基因在乳腺细胞中高效表达, 可用于构建乳腺特异性表达载体。

[关键词] β 乳球蛋白基因; 牛; PCR; 序列分析

[中图分类号] Q 823; Q 785

[文献标识码] A

[文章编号] 1671-9387(2003)03-0001-04

利用乳腺生物反应器能大规模地生产人类所急需的外源活性蛋白, 该法因具有独特的优点而引起人们的广泛关注。制备乳腺生物反应器最关键的环节是构建高效、特异的表达载体。 β 乳球蛋白(β -lactoglobulin, BLG)是反刍动物最主要的乳清蛋白, 大量研究证明, 它的调控成分能指导外源基因在乳腺细胞中特异、高效表达。杨国庆等^[1]以牛BLG基因5'调控序列作为启动子与人生长激素基因(hGH)构建表达载体, 在转基因小鼠乳清中hGH的表达量为420 mg/L。陈红星等^[2]以牛BLG基因5'调控序列构建表达载体, 获得组织型纤溶酶原激活剂(t-PA)转基因鼠, t-PA在乳腺中也有较高的表达量。最引人瞩目的是Wright^[3]以绵羊BLG基因的5'调控序列来表达 α 1-抗胰蛋白酶(α 1-AT), α 1-AT在转基因绵羊乳中表达量高达35 g/L。鉴于此, 本试验拟以牛BLG基因5'调控成分构建表达载体, 考虑到第一外显子和第一内含子在指导外源基因正确翻译、表达和分泌等方面中的作用, 也克隆了此序列。

1 材料与方法

1.1 材料

试验动物 美国荷斯坦奶牛由杨凌科元生物工程有限公司提供。

质粒和菌种 宿主菌DH5 α 为本室保存, 质粒pMD 18-T Vector购自大连宝生物公司。

试剂和仪器 限制性内切酶、T4连接酶和Marker均购自加拿大MBI公司, Taq DNA聚合酶、10 $\times$ PCR Buffer和dNTP Mixture购自大连宝生物公司, DNA Gel Extraction Kit和Plasmid Minipreps Kit购自上海生物工程公司, PCR仪为GeneAmp PCR-System 2400(美国PE公司), 凝胶成像分析系统为英国UVP GDS8000型, 紫外分光光度计为Cintra(GBC)型。

1.2 方法

奶牛基因组DNA的提取 奶牛颈静脉采血, 0.5 g/L EDTA抗凝, RNase酶、蛋白酶K消化后, 利用酚-氯仿法提取基因组DNA, 真空干燥后溶于300 μ L灭菌超纯水中, 并用紫外分光光度计测定DNA样品在260, 280 nm处的OD值, 计算DNA样品的浓度和纯度, 具体方法见参考文献[4]。

特异性引物设计 参考Alexander等^[5]发表在Gen Bank中的奶牛BLG全基因序列, 利用引物设计软件Prime Premier 5.0辅助设计。为方便构建表达载体, 在上、下游引物的5'端各加上了1个EcoRI限制性酶切位点和两个保护碱基, 引物序列如下:

上游引物 5' gcg, aat, tcA, TCC, CAC, GTG,

* [收稿日期] 2002-06-07

[基金项目] 国家“863”高技术资助项目(2001AA 213081)

[作者简介] 石玉强(1978-), 男, 山东滕州人, 在读硕士, 主要从事胚胎工程和分子生物学研究。

[通讯作者] 张涌(1956-), 男, 内蒙古和林格尔人, 教授, 博士生导师, 主要从事胚胎学与胚胎工程研究。

CCT, GC 3

下游引物 5' gag, aat, tcC, TGG, GGA, GGG, ACC, TT 3'

PCR 扩增 取DNA 样品 1 μL (100 ng), Mg^{2+} 4 μL (25 mmol/L), dNTP Mixture 4 μL (各 2.5 mmol/L), 引物各 2 μL (25 $\mu\text{mol/L}$), 超纯水 33 μL , 10 $\times$ PCR Buffer 5 μL , Taq 聚合酶 1 μL (5 U/ μL)。瞬间离心混匀, 首次 96 $^{\circ}\text{C}$ 变性 5 min 后, 94 $^{\circ}\text{C}$ 变性 30 s, 61 $^{\circ}\text{C}$ 退火 45 s, 72 $^{\circ}\text{C}$ 延伸 90 s, 进行 35 轮循环, 最后 72 $^{\circ}\text{C}$ 延伸 10 min。

琼脂糖电泳 制备 0.7 g/L 的琼脂糖凝胶, 加入溴化乙锭(EB) (20 mg/L) 至 1 mg/L。取 PCR 扩增产物 5 μL 与 6 $\times$ 凝胶电泳上样缓冲液 1 μL 混匀后, 点样电泳, 电压 5 V/cm。45 min 后, 在凝胶成像分析系统中观察结果并记录。

克隆 利用DNA Gel Extraction Kit 从琼脂糖凝胶上回收并纯化 PCR 产物后, 克隆在 pMD 18-T Vector 的 T 位点, 并转化感受态大肠杆菌, 蓝白筛选阳性菌落, 具体方法见参考文献[4]。

图 1 牛BLG 基因 5 调控成分 PCR 扩增电泳

A, B, C, D. PCR 产物; M. DNA marker

Fig 1 PCR product of bovine BLG gene 5 regulatory element

A, B, C, D. PCR product; M. DNA marker

2.4 序列分析结果

目的片段测序后, 利用BLAST 软件进行同源性分析, 结果见表 1。同时利用DNA Star 软件分析, 发现此调控成分含有多个调节因子作用位点或反应

目的片段的鉴定和序列测定 利用 Plasmid Miniprep s Kit 提取质粒后, EcoR I 酶切鉴定重组质粒, 最后送交大连宝生物公司完成序列测定。

2 结果

2.1 牛基因组DNA 的完整性

经紫外分光光度计测定, 牛基因组DNA 样品 OD 值为 1.72, 取 2 μL 进行 0.7 g/L 琼脂糖凝胶电泳, 溴化乙锭染色, 紫外灯下观察基因组DNA 无降解。

2.2 PCR 扩增结果

利用提取的基因组DNA 和特异性引物进行扩增, 取 5 μL PCR 扩增产物电泳, 发现与预期的扩增产物大小一致, 结果见图 1。

2.3 重组质粒酶切鉴定结果

利用蓝白筛选法筛选阳性重组菌落, 提取质粒后, EcoR I 酶切(电泳结果见图 2)鉴定, 目的片段已成功地在 pMD 18-T Vector 的 T 位点。

图 2 重组质粒 EcoR I 酶切电泳

A. pMD 18-T vector; B. 重组质粒酶切结果; M. DNA marker

Fig 2 The recombinant plasmid digested by EcoR I

A. pMD 18-T vector; B. Recombinant plasmid; M. DNA marker

元件, 其中包括视黄酸反应元件(RARE)、佛波酯反应元件(TRE)、乳腺特异性因子(MSBF)和核因子(NF1)结合位点等, 见图 3。

表 1 牛BLG 基因 5 调控成分序列的比较

Table 1 The comparison of bovine BLG gene 5 regulatory element with other mammals

哺乳动物 Mammals	基因 Gene	同源性/% Homology
奶牛 Cow	β 乳球蛋白 A 型基因 β lactoglobulin gene variant A	98.55
奶牛 Cow	β 乳球蛋白 B 型基因 β lactoglobulin gene variant B	99.79
山羊 Goat	β 乳球蛋白基因 β lactoglobulin gene	90.70
绵羊 Sheep	β 乳球蛋白基因 β lactoglobulin gene	90.09

```

1   atcccacgtg cctgcacgga gccctagtgc tactcaTREgtca tgccccgca gcaggggtcCKa
61  ggtcaret1ctttc ccacccctggg ggttattatg actggttgc tttgtgttc catttttgSmct
121 acctaactg ggcagcgggt gcttgacagag ccctcgatac tgaccaggtt cccccctcgg
181 agctcgacct gaaccccatg tcacccCACtcgc ccacgctgc agaggggtggg gtgactgcag
241 agatcccttt acccaaggcc acagtcacat ggtttggagg agatggtgcc caaggcagaa
301 gccacccCACtcc aggacacacc tgccccagt gctggctctg acctgtcctt gtctaagagg
361 ctgaccccag aagtgttctt ggcgctggca gccagcctgg acccagagcc tggacacccCACc
421 ctgccccccc acttctgggg cgGC boxtaccagga accgtccagg ccagagggg gccttcctgc
481 ttggcctcga atggaagaag gcctcctatt gtctctgtag aggaaPu-1gcaac ccaggggcc
541 aaggataggc caggggggat tcggggaaccMSBF gcgtggctgg gggcccggcc cgggctggct
601 ggctggccct cctcctgtat aaTATA boxggccccga gcccgctgctc tcagccctcc actccctgca
661 gagctcagaa gcgtgacccc agctgcagcc atgaagtgcc tctgtcttgc cctstartggccctc
721 acttgtggcg ccagggcctt cattgtcacc cagaccatgCodea agggcctgga tatccagaag
781 gttcgagggg gccccgggtg gtgggtgagtt gcagggcagg caggggagct gggcctcaga
841 gaccaagggg ggctgtgacg tctgggattc ccacagtcg gctagagccg cctgacaaat
901 cgccccccag ggcagcttca accaggcgtt tagtgtcttg cattctggag gctggaagcc
961 tgcaatccCAAT boxgg gcacggccc agctggctt cctgcggcc actctccggg gagcagacag
1021 ccactcttct cctgtgtcct ttgcgtgcc tggtttctc ttctgtgag gtcaret1ccaggg
1081 ctgctggatc cacgcccgcc cacacagcct cacgtaacct ttgtcatctc ttaaaggcc
1141 gtgtctccag tctgtgttg aggttctggg ggttaatggg acglycoacagttca gccctaaaa
1201 gagtactctt gccctcaaa tttccccac ctccagctat gtctcccaa gatccaaatg
1261 ttgccacgtg tgccggggct catctgggtc cctcttggg ctgagagtga gtctggggag
1321 agcattctc agggtgccga gttgggggga gcacctcagg gctgccagg ccagggtggg
1381 acagagagcc cactgtgggg ctgggggccc cttcccgcc ctggagtga gctcaaggtc
1441 cctccccag

```

图 3 牛 BLG 基因 5 调控成分的 DNA 序列及分析

CAAT box. CCAAT 框, 核因子-1 结合位点; CAC. GT-1c 蛋白结合位点; CK. 细胞因子 CK-2e 结合位点; Code. 翻译起始位点; GC box. GC 框, SP1 因子结合位点; glyco. 糖基化位点; MSBF. 乳腺特异性因子结合位点; Pu-1. Pu-1 因子结合位点; ret1. 视黄酸反应元件 (RARE); Sm. 核糖核蛋白 Sm 结合位点; Start. 转率起始位点; TATA box. TATA 框, TBF 因子结合位点; TRE. 佛波酯反应元件, AP1 结合位点

Fig. 3 The sequence and analysis of bovine BLG gene 5 regulatory element

CAAT box. CCAAT signal of RNA polymerase II. NF-1 factor binding site; CAC. GT-1c protein binding site; CK. cytokine-2e binding site; Code. start code of translation; GC box. GC signal of RNA polymerase II. SP-1 factor binding site; glyco. glycosylation site; MSBF. mammary specific binding factor site; Pu-1. Pu-1 factor binding site; ret1. retinoic acid response element (RARE); Sm. small nuclear ribonucleoprotein Sm binding site; Start. start code of transcription; TATA box. RNA polymerase binding site TATA-box binding protein site; TRE. TPA response element AP-1 factor binding site

3 讨论

利用乳腺生物反应器制备转基因动物, 是当前生物技术领域的研究热点之一, 但是外源基因在乳腺细胞中特异性表达受诸多因素的影响。内含子: 目前已经有充分的研究^[6]证实, 内含子 (特别是第一内含子) 对外源基因正确的剪接、修饰以及提高表达效率有重要的作用。这可能是由于内含子区包含增

强子序列以及基质结合区 (MAR)、内含子可开放染色体区域, 或通过内含子的剪接可增加 mRNA 在细胞质的稳定性, 在本研究中克隆牛 BLG 基因第一内含子序列正是基于此。位置效应: 表达构件在宿主染色体上的整合位点强烈影响外源基因的表达, 若外源基因整合在宿主异染色质区, 它的表达便会被强烈抑制, 然而有些表达构件似乎不存在整合效应, 表达水平直接与其在染色体上整合的拷贝数有关。

研究证明^[7], 乳腺细胞中 BLG 基因启动子区存在 DNase I 超敏感位点, 此位点是诸多反式作用因子识别和作用的位点, 与基因的表达息息相关。

本研究通过对牛 BLG 基因启动子区的克隆及序列分析, 发现此调控成分存在视黄酸反应元件 (RARE)、佛波酯反应元件 (TRE)、乳腺特异性因子 (MSBF) 和核因子 (NF1) 等诸多调节因子结合位

点, 这对调节外源基因在乳腺上皮细胞特异性的表达至关重要。同时, 本研究之所以克隆牛 BLG 基因第一外显子, 主要考虑第一外显子中的信号肽序列在指导外源基因特异性表达和分泌中是重要的。但是, 究竟此调控成分的活性如何, 还需要制作转基因动物来验证, 这也是作者目前正在从事的研究。

[参考文献]

- [1] 杨国庆, 戴蕴平, 朱宝利, 等. 牛 BLG 基因 5' 调控成分的克隆和制备乳腺生物反应器研究[J]. 中国科学(C 辑), 1996, 26(5): 463-469.
- [2] 陈红星, 程 萱, 杨 晓, 等. 牛 β 乳球蛋白基因调控序列指导组织纤溶酶原激活剂在小鼠乳腺中的表达[J]. 生物工程学报, 2001, 17(2): 135-139.
- [3] Wright G. High level expression of active human α -antitrypsin in the milk of transgenic sheep[J]. Biotechnology, 1991, 9: 830-834.
- [4] Sambrook J, Fritsch E F, Maniatis T, et al. Molecular cloning a laboratory manual[M]. 2nd ed. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1988.
- [5] Alexander L J, Hayes G, Bawden W, et al. Complete nucleotide sequence of the bovine β -lactoglobulin gene[J]. Animal Biotechnology, 1993, 4(1): 1-10.
- [6] Hyttinen J M, Korhonen V P, Hiltunen W D, et al. High level expression of bovine beta-lactoglobulin gene in transgenic mice[J]. J Biotechnol, 1998, 61(3): 191-199.
- [7] Kim S J, Sohn B H, Jeong S, et al. High level expression of human lactoferrin in milk of transgenic mice using genomic lactoferrin sequence[J]. J Biochem, 1999, 126(2): 320-325.

The isolation, cloning and sequence analysis of bovine β lactoglobulin gene 5' regulatory elements

SHI Yu-qiang, ZHANG Yong, ZHENG Yue-mao, LIU Jian-zhong, ZHANG Zhi-ping

(Institute of Bio-Engineering, Northwest Sci-Tech University of Agriculture and Forestry, Yangling, Shanxi 712100, China)

Abstract: For the purpose of constructing mammary gland specific expressional vector, the bovine β lactoglobulin gene 5' flanking fragment was cloned by PCR amplification. It consisted in part of the gene upstream region about 645 bp, the first exon and the first intron about 804 bp. After PCR product was recovered and purified, the aim fragment was cloned at T site of pMD 18-T Vector. The fragment was sequenced, and it was compared with bovine BLG gene variant A, bovine BLG gene variant B, goat and sheep BLG gene. The results indicated the homology was 98.55%, 99.79%, 90.70% and 90.09% respectively. The nucleotide acid sequence was analyzed by computer, and found many factor or protein binding sites and response elements such as mammary specific binding factor (MSBF), nuclear factor-1 (NF-1), retinoic acid response element (RARE) and TPA response element (TRE). It suggested the cloned regulatory element should direct extra genes to express specifically in mammary gland epithelia cells, and it could be used as constructing mammary gland-specific expressional vector.

Key words: β lactoglobulin gene; bovine; PCR; sequence analysis