bcl-2/ EGFP 融合基因真核表达质粒的构建*

彭树英,安志兴,张 涌

(西北农林科技大学 生物工程研究所,陕西 杨凌 712100)

[摘 要] 为深入研究 bcl-2 对细胞凋亡的调控机制和肿瘤发生发展的影响,应用基因重组手段,根据表达载体 pEGFP-C1 上的多克隆位点和 bcl-2 基因序列设计了 1 对引物,对含有 bcl-2 基因的质粒 pWB-bcl 进行了 PCR 扩增,得到了 708 bp 的目的片段。将其克隆到 pMD18-T vector,筛选阳性克隆并测序,序列分析表明,其与原初序列同源性达 99%。将 bcl-2 插入到载体启动子下游,与报告基因绿色荧光蛋白(Enhancer Green Fluorescent Protein, EGFP)融合,经限制性内切酶酶切和 PCR 鉴定,证明 Bcl-2/EGFP 真核表达质粒构建成功。

[关键词] bcl-2;绿色荧光蛋白;真核表达质粒

[中图分类号] Q819; R318

[文献标识码] A

[文章编号] 1671-9387(2004)12-0065-04

原癌基因 B 细胞淋巴瘤/白血病-2 基因(B cell lymphoma/leukemia-2 gene, bcl-2)在细胞凋亡的调控过程中具有极其重要的作用,最初是从伴有 t(14, 18)染色体易位的滤泡状 B 细胞淋巴瘤中发现的^[1]。随着细胞凋亡研究的不断深入,人们对肿瘤的发生、发展也有了新的认识,肿瘤的发生不仅与细胞过度增殖有关,也与细胞凋亡减少有关^[2,3]。大量研究表明^[4~9], bcl-2 与多种肿瘤的发生、发展密切相关,其不同于一般致癌的癌基因,而是通过抑制细胞凋亡,延长细胞寿命,使细胞数积累增多来促进肿瘤形成的^[10]。原癌基因 bcl-2 抑制细胞凋亡的研究,不仅在理论上具有重大意义,而且在临床治疗上也具有诱人的前景。然而,关于 bcl-2 的具体作用机制,目前仍知之甚少,有关研究还需深入。因此,本研究构建了能够在哺乳动物细胞中高效表达的 bcl-2/EGFP 真核表达质粒,以期为 bcl-2 基因调控细胞的凋亡机制研究提供检测方便、快捷的候选载体。

1 材料与方法

1.1 质粒和菌株

质粒 pWB-bcl 由解放军军需大学提供;载体 pEGFP-C1 购自 Clontech 公司;pMD18-T vector 购自大连宝生物工程有限公司;E. coli DH5 由西北农林科技大学生物工程研究所分子生物实验室保存。

1.2 工具酶及试剂

各种限制性内切酶、T₄ DNA 连接酶购自 Promega 公司;Taq DNA 聚合酶和 dNTP 购自大连宝生物工程有限公司;Marker 购自加拿大 MBI 公司;DNA Gel Extraction kit 和 Plasmid Miniprips kit 购自杭州维特洁生物工程公司;PCR 引物由上海生物工程服务公司合成。

1.3 仪器

Gene AmpR PCR-2 400(美国 PE 公司);UVP GDS 8 000 凝胶成像分析系统(英国);冷冻离心机(德国 Sigma 公司);DK-8D 电热恒温水槽(上海医用恒温设备厂)。

1.4 引物设计

根据质粒 pWB-bcl 上 bcl-2 基因和载体 pEGFP-C1 的多克隆位点,利用 Primer 5.0 设计 1 对引物 b1 和 b2,为便于构建表达载体,2 条引物 5 端分别添加了酶切位点 EcoR 和 Kpn,引物序列如下:

b1: 5' cg GAA TT Ctatggcgcaagccggag3

b2: 5' cg GGTAC Ctcacactggcccaggtatgcacc3

1.5 bcl-2 基因的 PCR 扩增

在 PCR 反应管中加入适量模板 pWB-bcl, 10 × Taq buffer 5 μL, 10 mmol/L dNTP 1 μL, 10 μmol/L 上下游引物各 1 μL, 5 U/L Taq DNA 聚合酶 1 μL, 25 mmol/L MgCl₂ 3.5 μL, 最后加 ddH₂O 至终体积 50 μL, 混匀, 瞬时离心, 进行 PCR 扩增, 设置循环参

* [收稿日期] 2003-11-27

[基金项目] 国家“863”高科技项目(2001AA213081)

[作者简介] 彭树英(1977-),女,内蒙古通辽人,在读硕士,主要从事胚胎工程及分子生物学研究。

[通讯作者] 张 涌(1956-),男,内蒙古和林格尔人,教授,博士生导师,主要从事动物胚胎工程和发育生物学研究。

数:首次变性 94 °C 4 min 后,再 94 °C 30 s,58 °C 45 s,72 °C 延伸 1 min,进行 30 个循环,最后 72 °C 延伸 10 min。反应完毕后,取 5 μL 8 g/L 琼脂糖凝胶电泳 40~50 min,在凝胶成像系统上观察结果。

1.6 PCR 产物回收、克隆、酶切鉴定及序列分析

按胶回收试剂盒说明书回收纯化 PCR 产物,将回收产物克隆在 pMD18-T vector 的 T 位点,并转化感受态细胞。蓝白斑筛选阳性克隆菌落,具体方法见参考文献 [11]。提取重组质粒 pMD18-bcl, BamH I 酶切鉴定,穿刺培养过夜,送交上海生物工程有限公司完成序列测定。

1.7 pEGFP-bcl 真核表达载体构建

质粒 pMD-bcl 和载体 pEGFP-C1 分别经 *EcoR*、*Kpn* 双酶切过夜,回收,编号分别 EKB 和 EKG;将 EKB 和 EKG 按适当比例混合,加入 *T₄* DNA 连接酶,16 °C 连接过夜,连接产物转化至 *E. coli* DH5 感受态细胞,涂布于含抗生素 Kana 的 LB 培养基上,培养 16~24 h;挑取单个阳性菌落,提取重组质粒 pEGFP-bcl,再经 *EcoR*、*Kpn* 双酶切, BamH I 单酶切鉴定。然后以质粒 pEGFP-bcl 为模板,利用引物 b1 和 b2 进行 PCR 鉴定。表达载体构建过程见图 1。

图 1 pEGFP-bcl 融合基因表达载体构建策略

Fig. 1 Construction strategy of pEGFP-bcl fused gene expressing vector

2 结果与分析

2.1 bcl-2 的扩增产物

以质粒 pWB-bcl 为模板,利用引物 b1 和 b2 进行 PCR 扩增,取 5 μL 扩增产物电泳,得到 708 bp 的目的基因 bcl-2,结果见图 2。

2.2 重组克隆 pWB-bcl 的酶切分析

已知 bcl-2 基因和克隆载体 pMD18-T 均有单一的 BamH I 酶切位点,经 BamH I 酶切得到 3 110 和 154 bp 的目的片段,可以确定 bcl-2 已反向插入到 pMD18-T 的多克隆位点内。

2.3 bcl-2 的核酸序列分析

测序结果表明, bcl-2 基因编码框完整, 含 233 个氨基酸, 与原初序列同源性达 99%。BLAST 软件分析表明, 该基因与小鼠、大鼠同源性达 90% 以上, 与鸡的 bcl-2 同源性达 70% 以上。

2.4 重组子 pEGFP-bcl 酶切鉴定

将阳性重组子 pEGFP-bcl 和 pEGFP-C1 分别进

行 *Ase* / *Mlu* 双酶切和 *EcoR* / *Kpn* 双酶切, 可分别得到预期结果 3.1 kb + 2.3 kb, 3.1 kb + 1.6 kb (图 3, 4)。

利用引物 b_1 , b_2 , 以初步酶切鉴定为阳性的重组子为模板扩增得到 708 bp 的片段 (图 5), 从而进一步说明 pEGFP-bcl 确为阳性重组子。

图 2 PCR 产物的电泳图

M. 3 kb marker; 1, 2. PCR 产物

Fig. 2 Electrophoresis of PCR product

M. 3 kb marker; 1, 2. PCR product

图 3 *Ase* / *Mlu* 双酶切阳性重组子

pEGFP-bcl 和载体 pEGFP-C1

M. 3 kb DNA Marker; 1. *Ase* / *Mlu* 酶切 pEGFP-bcl;

2. *Ase* / *Mlu* 酶切 pEGFP-C1

Fig. 3 *Ase* / *Mlu* digested pEGFP-bcl and pEGFP-C1

M. 3 kb DNA Marker; 1. *Ase* / *Mlu* digested pEGFP-bcl; 2. *Ase* / *Mlu* digested pEGFP-C1

图 4 酶切鉴定 pEGFP-bcl

M. DNA Marker; 1. *EcoR* / *Kpn* 酶切 pEGFP-bcl;

2. *Ase* / *Mlu* 酶切 pEGFP-bcl; 3. *Bam*H 酶切 pEGFP-bcl

Fig. 4 Identification of recombinant plasmid pEGFP-bcl

M. DNA Marker; 1. *EcoR* / *Kpn* digested doubly

pEGFP-bcl; 2. *Ase* / *Mlu* digested pEGFP-bcl;

3. *Bam*H digested pEGFP-bcl

3 讨论

利用细胞或转基因动物模型研究 bcl-2 对细胞凋亡作用的调控机制, 首先要构建 bcl-2 cDNA 真核表达质粒。关于构建 bcl-2 真核表达质粒的研究已有很多, 如张书霞等^[12] 构建的鸡 bcl-2 真核表达质粒及赵君等^[13] 所构建的小鼠乳腺定位表达人 bcl-2 的表达质粒。但目前国内尚未出现以 EGFP 基因为

报告基因构建 bcl-2 真核表达质粒的报道。因此, 本研究构建了 bcl-2/EGFP 融合基因真核表达质粒, 这种以 EGFP 为报告基因的表达载体具有以下优点:

检测方便。因为 EGFP 荧光反应不需要外加底物 (酶或其他共反应因子), 因此不存在难于进入细胞的问题, 而且 EGFP 发射的荧光用肉眼或荧光显微镜就可检测, 从而能间接检测与其相融合的 bcl-2 的表达情况^[14]。荧光稳定。EGFP 对光致漂白作

用有强烈的耐受性,能耐受长时间光照,从而延长了探测时间。EGFP 对宿主细胞无任何毒害。因此,在研究 bcl-2 对细胞凋亡的调控机制时,不必担心 EGFP 会对细胞凋亡产生影响。具有共用性和通用性。即不受受体范围的限制,可以在细胞、胚胎或转基因动物模型中表达。

bcl-2 作为一种功能蛋白调节基因,其表达涉及 mRNA 转录后剪接。因此,构建其 cDNA 真核表达质粒时,必须在 bcl-2 基因上游引入外源强启动子,确保转录启动,在其下游引入 poly 加尾信号则有助于提高转录剪接后 mRNA 的稳定性和表达效率。载体 pEGFP-C1 中的启动子 CMV 和加尾信号 SV40 poly 是两个高效的转录调控元件,将 bcl-2 插

入到 pEGFP-C1 的多克隆位点中,即将 bcl-2 克隆到启动子 CMV 和加尾信号 SV 40 poly 间的 EGFP 基因 C 末端,并与其融合,以确保 bcl-2 在宿主细胞内的有效表达及其产物特定调节功能的发挥。

bcl-2 基因抗细胞凋亡的研究,无论在理论上还是实际应用中均具有不可估量的前景。如人为造成 bcl-2 基因过量表达,可使细胞在无血清蛋白的培养基中存活时间增长。因此利用表达质粒将 bcl-2 cDNA 导入生产生物药品乳腺细胞株或乳腺生物反应器中,制成生存能力增强的转基因宿主,可达到降低成本、提高产量的功效,其产物应用在临床上进行肿瘤防治,必将产生巨大的经济效益和社会效益。

[参考文献]

- [1] Tsujimoro Y, Cossman J, Jaffe E, et al. Involvement of bcl-2 gene in human follicular lymphoma[J]. Science, 1985, 228: 1440 - 1443.
- [2] Chou H K, Chen S-L, Hsu C-T, et al. bcl-2 accelerate retinoic acid induced growth arrest and recovery in human gastric cancer cells[J]. Biochem J, 2000, 348: 2473 - 2479.
- [3] 韩克强, 吴娅利. 抗凋亡基因 bcl-2 与肿瘤研究进展[J]. 中国医师杂志, 2003, (增刊): 303 - 305.
- [4] La Q T, Abel P, Foster C S, et al. bcl-2 role in epithelial differentiation and oncogenesis[J]. Hum pathol, 1996, 27: 102.
- [5] Joensa, Pylkanen L, Tokanen S, et al. bcl-2 protein expression and long term survival in breast cancer[J]. Am J Pathol, 1994, 145 (5): 187 - 191.
- [6] 杨永健, 刘世玉, 胡厚祥, 等. 转染 bcl-2 基因对心肌细胞缺氧耐受性的影响[J]. 第三军医大学学报, 2000, 22(8): 727 - 730.
- [7] 马银斌, 吴成义. bcl-2 基因在甲状腺癌中的表达与意义[J]. 重庆医学, 2003, 32(9): 1256 - 1258.
- [8] 张 杰, 彭玮丹, 惠宏襄, 等. 翻译 bcl-2 在胃癌细胞中的诱导表达及促凋亡的作用[J]. 生物化学与生物物理学报, 1999, 31(3): 279 - 283.
- [9] Michael D J, Matin C R. Programmed cell death and bcl-2 protein in very low oxygen[J]. Nature, 1995, 374: 814 - 816.
- [10] 刘凌云, 薛绍白, 柳惠图, 等. 细胞生物学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2002.
- [11] 萨姆布鲁克 J, 弗里奇 E F, 曼尼阿蒂斯 T. 分子克隆指南[M]. 第 2 版. 北京: 科学出版社, 1995.
- [12] 张书霞, 步志高, 陈万方, 等. 鸡 bcl-2 表达质粒的构建及其对转染细胞凋亡的影响[J]. 中国农业科学, 2003, 33(6): 88 - 94.
- [13] 赵 君, 任文陟, 张守锋, 等. 人 bcl-2 乳腺定位表达转基因小鼠的建立[J]. 中国兽医学报, 2002, 22(5): 430 - 432.
- [14] 周盛梅, 孟凡国, 黄大年, 等. 绿色荧光蛋白及其应用[J]. 生物工程进展, 1999, 19: 56 - 60.

Construction of bcl-2/ EGFP fused gene eukaryotic expressing plasmid

PENG Shu-ying, AN Zhi-xing, ZHANG Yong

(Institute of Bio Engineering, Northwest A & F University, Yangling, Shaanxi 712100, China)

Abstract: The pro-oncogene B cell lymphoma/leukemia-2 gene (bcl-2) plays an important role in the regulation of apoptosis. In order to study deeply the mechanism, the eukaryotic expressing vector of bcl-2/ EGFP fused gene was constructed by the methods of gene recombining. A pair of primer was designed according to multiple cloning sites of pEGFP-C1 vector and the gene sequence of bcl-2 cDNA. The pWB-bcl plasmid which contains bcl-2 gene was amplified by PCR. The product of PCR was 708 bp. bcl-2 was integrated into pMD18-T vector. The recombinant pMD-bcl plasmid was sequenced and analyzed, homology was 99. bcl-2 gene was inserted into the promoter downstream of pEGFP-C1 vector and fused with Enhancer Green Fluorescent Protein (EGFP) gene. The result affirmed that bcl-2/ EGFP fused gene eukaryotic expressing vector was constructed successfully by the restricted endonuclease and PCR.

Key words: bcl-2; EGFP fused gene eukaryotic; expressing plasmid